

Prospecto del Artículo

701961 AERO RED 40 MG 100 COMPRIMIDOS MASTICABLES

ACCIÓN Y MECANISMO

Antiflatulento. Dimetilpolisilosano de cadena de longitud variable. Actúa reduciendo la tensión superficial de las burbujas de gas, facilitando su disgregación.

FARMACOCINÉTICA

La simeticona no se absorbe a través de la mucosa gastro-intestinal, eliminándose íntegramente por heces.

INDICACIONES

- Alivio sintomático de AEROFAGIA y/o FLATULENCIA.

POSOLOGÍA

* Cápsulas y comprimidos: - Adultos y niños mayores de 12 años, oral: 120 mg 3-4 veces al día o 240 mg dos veces al día, después de las comidas. Dosis máxima: 500 mg/día.

REACCIONES ADVERSAS

Los efectos adversos de dimeticona son, en general, leves y transitorios.

- Digestivas: Frecuencia desconocida: ESTREÑIMIENTO, NAUSEAS, DOLOR ABDOMINAL.
- Alérgicas/dermatológicas: Frecuencia desconocida: ERUPCIONES EXANTEMATICAS, PRURITO, REACCIONES DE HIPERSENSIBILIDAD como EDEMA facial y DISNEA.

SOBREDOSIS

- Síntomas: No se han descrito casos de sobredosificación. Aún en el caso de que se ingiera una cantidad muy superior a la indicada, es muy poco probable que se produzcan efectos adversos, debido a la falta de absorción digestiva del fármaco.

- Tratamiento: sintomático. No hay procedimiento especial recomendado.

PRECAUCIONES

- Se recomienda una duración máxima del tratamiento de 15 días seguidos. Si los síntomas persisten transcurrido este tiempo, se deberá reevaluar la situación clínica.

PRECAUCIONES RELATIVAS A EXCIPIENTES

- Este medicamento contiene sacarosa. Los pacientes con INTOLERANCIA A FRUCTOSA hereditaria, malaabsorción de glucosa o galactosa, o insuficiencia de sacarasa-isomaltasa, no deben tomar este medicamento.

EMBARAZO

Categoría C de la FDA. No existen estudios adecuados y bien controlados. Generalmente se admite su uso en embarazadas, debido a la falta de absorción digestiva del fármaco por la madre.

LACTANCIA

Se ignora si este medicamento es excretado con la leche materna, no obstante, no se espera que haya excreción debido a la falta de absorción digestiva del fármaco por la madre. Uso generalmente aceptado.

NIÑOS

No se prevén problemas específicamente pediátricos en este grupo de edad. Uso aceptado en niños y lactantes.

ANCIANOS

No se prevén problemas específicamente geriátricos en este grupo de edad. Uso aceptado.

NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN

* Comprimidos masticables: Masticar bien los comprimidos antes de tragarlos (no deben

tragarse enteros), administrados después de las comidas.