

## Prospecto del Artículo

650452 ANTISTAX 360 MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS

### ACCIÓN Y MECANISMO

- Vasoprotector, estabilizador de capilares. Las hojas de vid roja contienen en su composición flavonoides como quercitrina e isoquercitrina, que actúan estabilizando la superficie del endotelio vascular, normalizando su permeabilidad y disminuyendo la extravasación de plasma y proteínas y el edema asociado a procesos de insuficiencia venosa.

### INDICACIONES

- INSUFICIENCIA VENOSA. Tratamiento a corto plazo de los síntomas de la insuficiencia venosa leve de las piernas, como dolor, sensación de pesadez, hormigueo, prurito, VARICES o piernas hinchadas.

### POSOLOGÍA

- Adultos, oral: 360 mg/24 h, antes del desayuno. Si fuera necesario podría aumentarse a 720 mg/24 h.

- Niños y adolescentes menores de 18 años, oral:\* Adolescentes mayores de 12 años: igual que adultos.\* Niños menores de 12 años: no se ha evaluado la seguridad y eficacia.

El tratamiento puede prolongarse durante un máximo de 8 semanas, salvo recomendación facultativa. Olvido de dosis: tomar cuanto antes si ha transcurrido poco tiempo. En caso contrario, omitir la dosis. No duplicar la dosis en la siguiente administración.

### INTERACCIONES

No se han realizado estudios de interacciones.

### REACCIONES ADVERSAS

Las reacciones adversas se describen según cada intervalo de frecuencia, considerándose muy frecuentes (>10%), frecuentes (1-10%), poco frecuentes (0,1-1%), raras (0,01-0,1%), muy raras (<0,01%) o de frecuencia desconocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles).- Digestivas: poco frecuentes NAUSEAS y molestias digestivas.- Dermatológicas: poco frecuentes ERUPCIONES EXANTEMATICAS, URTICARIA.- Alérgicas: poco frecuentes REACCIONES DE HIPERSENSIBILIDAD.

### CONSEJOS AL PACIENTE

- No usar durante más de 8 semanas sin recomendación médica.- Informe a su médico y/o farmacéutico si presenta alguno de estos síntomas:\* Inflamación repentina de las piernas, enrojecimiento de la piel o dolor o sensación de presión o calor.

### SOBREDOSIS

Síntomas: experiencia muy limitada. Tratamiento: sintomático.

### COMPOSICIÓN

- Por comprimido: Extracto seco de hojas de Vitis vinifera L. (hojas de vid roja), 360 mg.

### CONTRAINDICACIONES

- Hipersensibilidad a la vid roja o a cualquier otro componente del medicamento.

### PRECAUCIONES

- Si durante el tratamiento aparece inflamación repentina de las piernas, enrojecimiento de la piel, o sensación de presión, dolor o calor, podría ser indicativo de una tromboflebitis. Consultar con un médico en estas situaciones.

### LACTANCIA

Se desconoce si se excreta con la leche, y las consecuencias que podría tener para el

lactante. Se recomienda suspender la lactancia o evitar su administración.

## **NIÑOS**

Los extractos de vid roja se han usado en adolescentes a partir de 12 años. Consultar la posología específica de las diferentes presentaciones. No se ha evaluado la seguridad y eficacia en niños menores de 12 años, por lo que se recomienda evitar su empleo.

## **ANCIANOS**

No se han descrito problemas específicos en ancianos que obliguen a un reajuste posológico específico.

## **NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN**

Ingerir los comprimidos o las cápsulas enteros, sin masticar, con un vaso de agua.

## **EFFECTOS SOBRE LA CONDUCCIÓN**

No se han realizado estudios, si bien no parece probable que afecte negativamente a la conducción o manejo de maquinaria peligrosa.

## **POSOLOGÍA EN INSUFICIENCIA RENAL**

No requiere reajuste posológico.

## **POSOLOGÍA EN INSUFICIENCIA HEPÁTICA**

No requiere reajuste posológico.

## **ADVERTENCIAS ESPECIALES**

- Deberá descartarse una posible tromboflebitis en caso de hinchazón repentina de las piernas, enrojecimiento de la piel o dolor o sensación de presión o calor en las piernas.