

Prospecto del Artículo
690266 CAMILINA ARKOPHARMA 300 MG 200 CAPSULAS

INDICACIONES

- Tratamiento complementario en adultos y adolescentes a partir de 12 años en dietas de control de peso para facilitar la eliminación de líquidos del organismo, en personas con **SOBREPESO** y un IMC entre 25-29,9 kg/m².

Su utilización se basa exclusivamente en un uso tradicional. **POSOLOGÍA**

- Adultos: 3 cápsulas 2 veces al día, con el desayuno y la comida. - Niños y adolescentes < 18 años: * Adolescentes a partir de 12 años: igual que adultos. * Niños < 12 años: no se recomienda. - Ancianos: no se han realizado recomendaciones posológicas específicas. Duración del tratamiento: 6-8 semanas. Olvido de dosis: administrar la dosis olvidada cuanto antes, salvo que faltara poco tiempo para la siguiente. Administrar la siguiente dosis a la hora habitual. No duplicar la siguiente dosis.

INTERACCIONES

No se han realizado estudios.

REACCIONES ADVERSAS

Las reacciones adversas se describen según cada intervalo de frecuencia, considerándose muy frecuentes (>10%), frecuentes (1-10%), poco frecuentes (0,1-1%), raras (0,01-0,1%), muy raras (<0,01%) o de frecuencia desconocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles). - Trastornos del sistema nervioso: frecuencia desconocida **NERVIOSISMO, INSOMNIO**. - Trastornos vasculares: frecuencia desconocida **HIPERTENSION ARTERIAL**.

CONSEJOS AL PACIENTE

- Este medicamento debe usarse como complemento a la dieta hipocalórica y la práctica habitual de ejercicio físico.

SOBREDOSIS

Síntomas: no hay datos disponibles. Medidas a tomar: - Antídoto: no hay antídoto específico. - Medidas generales de eliminación: no se han descrito. - Monitorización: estado clínico del paciente. - Tratamiento: sintomático.

CONTRAINDICACIONES

- Hipersensibilidad al té, **ALERGIA A XANTINAS** o a cualquier otro componente del medicamento. - **INSUFICIENCIA HEPATICA**.

PRECAUCIONES

- **EDEMA**. El té está destinado a la eliminación de edemas asociados a sobrepeso. No se aconseja su empleo en caso de **INSUFICIENCIA RENAL** o **INSUFICIENCIA CARDIACA**. - El contenido en cafeína podría agravar situaciones como **ANSIEDAD, NERVIOSISMO, INSOMNIO** o **HIPERTENSION ARTERIAL**.

EMBARAZO

Seguridad en animales: no hay datos disponibles. Seguridad en humanos: no se dispone de estudios adecuados y bien controlados en humanos. No se recomienda su empleo. Efectos sobre la fertilidad: no se han realizado estudios específicos en humanos.

LACTANCIA

Seguridad en animales: no hay datos disponibles. Seguridad en humanos: se desconoce si se excreta con la leche, y las consecuencias que podría tener para el lactante. No se recomienda su empleo.

NIÑOS

El té está autorizado en adolescentes a partir de 12 años, no siendo necesario un ajuste

posológico en comparación con adultos. No se ha evaluado la seguridad y eficacia en niños < 12 años, por lo que se recomienda evitar su utilización.

ANCIANOS

No se han descrito problemas específicos en ancianos que obliguen a un reajuste posológico.

NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN

Tragar las cápsulas enteras con suficiente cantidad de líquido. Administración con alimentos: puede tomarse con o sin alimentos.

EFFECTOS SOBRE LA CONDUCCIÓN

Es poco probable que presente efectos significativos.

POSOLOGÍA EN INSUFICIENCIA RENAL

No se han realizado recomendaciones posológicas específicas.

POSOLOGÍA EN INSUFICIENCIA HEPÁTICA

Contraindicado.