

Prospecto del Artículo

762328 DIFUR 120 MG 96 CAPSULAS

INDICACIONES

- DERMATITIS. Tratamiento de los síntomas asociados a procesos inflamatorios leves a moderados de la piel. Su eficacia se basa en un uso exclusivamente tradicional.

POSOLOGÍA

- Adultos y adolescentes mayores de 12 años, oral: 1 cápsula 3 veces al día. Si fuera necesario se podrá administrar una cápsula adicional preferiblemente de noche. El tratamiento se prolongará hasta 4 semanas, salvo recomendación médica.- Niños de 6-12 años: 1 cápsula/12 h.- Niños < 6 años: no se ha evaluado la seguridad y eficacia. Tomar 30 min antes de las principales comidas. Si los síntomas continúan o empeoran después de 2 semanas de tratamiento se recomienda consultar con el médico y/o farmacéutico.

INTERACCIONES

- Alcohol. Las bebidas alcohólicas podrían alterar la absorción del extracto de Polypodium leucotomos. Se recomienda evitar el consumo de alcohol durante el tratamiento.- Antiácidos. Se recomienda evitar la utilización de antiácidos inmediatamente antes de su administración, ya que podría reducirse la absorción digestiva.

REACCIONES ADVERSAS

Las reacciones adversas se describen según cada intervalo de frecuencia, considerándose muy frecuentes (>10%), frecuentes (1-10%), poco frecuentes (0,1-1%), raras (0,01-0,1%), muy raras (<0,01%) o de frecuencia desconocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles).- Digestivas: raras alteraciones digestivas.- Dermatológicas: raras ERUPCIONES EXANTEMATICAS, PRURITO.

CONSEJOS AL PACIENTE

- Tomar 30 min antes de las comidas.- El tratamiento se prolongará durante un máximo de 4 semanas, salvo que el médico indique lo contrario.- Si los síntomas continúan o empeoran después de 2 semanas de tratamiento se recomienda consultar con el médico y/o farmacéutico.- Evitar el consumo de bebidas alcohólicas durante el tratamiento.

SOBREDOSIS

Síntomas: no se han descrito casos de sobredosis. Tratamiento: sintomático.

CONTRAINDICACIONES

- Hipersensibilidad a cualquier componente del medicamento.

PRECAUCIONES

- Los pacientes con FIEBRE, INFECCION, HIPERTENSION ARTERIAL o INSUFICIENCIA CARDIACA deberán usar este medicamento bajo recomendación médica.

PRECAUCIONES RELATIVAS A EXCIPIENTES

- Este medicamento contiene lactosa. Los pacientes con INTOLERANCIA A LACTOSA hereditaria o galactosa, insuficiencia de lactasa de Lapp o malaabsorción de glucosa o galactosa, no deben tomar este medicamento.

EMBARAZO

No se dispone de estudios adecuados y bien controlados en humanos. Se recomienda evitar su empleo durante el embarazo. Efectos sobre la fertilidad: no se dispone de datos acerca de sus posibles efectos sobre la fertilidad.

LACTANCIA

Se desconoce si se excreta con la leche, y las consecuencias que podría tener para el lactante. Se recomienda suspender la lactancia o evitar su administración.

NIÑOS

No se ha evaluado la seguridad y eficacia en niños menores de 6 años, por lo que se recomienda evitar su utilización. Los niños entre 6 y 12 años requieren un reajuste posológico.

ANCIANOS

No se han descrito problemas específicos en ancianos.

NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN

Tomar las cápsulas enteras con ayuda de un poco de líquido.

EFFECTOS SOBRE LA CONDUCCIÓN

No parece afectar de manera significativa a la capacidad para conducir o manejar maquinaria peligrosa.