

## Prospecto del Artículo

724229 **REGENER 120 MG 96 CAPSULAS**

### INDICACIONES

- DERMATITIS. Tratamiento de los síntomas asociados a procesos inflamatorios leves a moderados de la piel. Su eficacia se basa en un uso exclusivamente tradicional.

### POSOLOGÍA

- Adultos y adolescentes mayores de 12 años, oral: 1 cápsula 3 veces al día. Si fuera necesario se podrá administrar una cápsula adicional preferiblemente de noche. El tratamiento se prolongará hasta 4 semanas, salvo recomendación médica.- Niños de 6-12 años: 1 cápsula/12 h.- Niños < 6 años: no se ha evaluado la seguridad y eficacia. Tomar 30 min antes de las principales comidas. Si los síntomas continúan o empeoran después de 2 semanas de tratamiento se recomienda consultar con el médico y/o farmacéutico.

### INTERACCIONES

- Alcohol. Las bebidas alcohólicas podrían alterar la absorción del extracto de Polypodium leucotomos. Se recomienda evitar el consumo de alcohol durante el tratamiento.- Antiácidos. Se recomienda evitar la utilización de antiácidos inmediatamente antes de su administración, ya que podría reducirse la absorción digestiva.

### REACCIONES ADVERSAS

Las reacciones adversas se describen según cada intervalo de frecuencia, considerándose muy frecuentes (>10%), frecuentes (1-10%), poco frecuentes (0,1-1%), raras (0,01-0,1%), muy raras (<0,01%) o de frecuencia desconocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles).- Digestivas: raras alteraciones digestivas.- Dermatológicas: raras ERUPCIONES EXANTEMATICAS, PRURITO.

### CONSEJOS AL PACIENTE

- Tomar 30 min antes de las comidas.- El tratamiento se prolongará durante un máximo de 4 semanas, salvo que el médico indique lo contrario.- Si los síntomas continúan o empeoran después de 2 semanas de tratamiento se recomienda consultar con el médico y/o farmacéutico.- Evitar el consumo de bebidas alcohólicas durante el tratamiento.

### SOBREDOSIS

Síntomas: no se han descrito casos de sobredosis. Tratamiento: sintomático.

### CONTRAINDICACIONES

- Hipersensibilidad a cualquier componente del medicamento.

### PRECAUCIONES

- Los pacientes con FIEBRE, INFECCION, HIPERTENSION ARTERIAL o INSUFICIENCIA CARDIACA deberán usar este medicamento bajo recomendación médica.

### PRECAUCIONES RELATIVAS A EXCIPIENTES

- Este medicamento contiene lactosa. Los pacientes con INTOLERANCIA A LACTOSA hereditaria o galactosa, insuficiencia de lactasa de Lapp o malaabsorción de glucosa o galactosa, no deben tomar este medicamento.

### EMBARAZO

No se dispone de estudios adecuados y bien controlados en humanos. Se recomienda evitar su empleo durante el embarazo. Efectos sobre la fertilidad: no se dispone de datos acerca de sus posibles efectos sobre la fertilidad.

### LACTANCIA

Se desconoce si se excreta con la leche, y las consecuencias que podría tener para el lactante. Se recomienda suspender la lactancia o evitar su administración.

## **NIÑOS**

No se ha evaluado la seguridad y eficacia en niños menores de 6 años, por lo que se recomienda evitar su utilización. Los niños entre 6 y 12 años requieren un reajuste posológico.

## **ANCIANOS**

No se han descrito problemas específicos en ancianos.

## **NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN**

Tomar las cápsulas enteras con ayuda de un poco de líquido.

## **EFFECTOS SOBRE LA CONDUCCIÓN**

No parece afectar de manera significativa a la capacidad para conducir o manejar maquinaria peligrosa.