

## Prospecto del Artículo

871038 **TEBOFORTAN 40 MG 60 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS**

### ACCIÓN Y MECANISMO

- Vasodilatador. Las hojas de ginkgo parecen mejorar el riego sanguíneo cerebral y periférico debido a unos posibles efectos vasodilatadores y antiagregantes plaquetarios, mejorando las propiedades reológicas de la sangre. Se desconoce el mecanismo exacto y cuáles son los principios activos responsables, si bien se postula que podrían ser los flavonoides, como quercetina, y los terpenoides como ginkgólidos y bilobálicos.

### INTERACCIONES

- Anticoagulantes. El ginkgo podría aumentar el riesgo de hemorragia al combinar con fármacos anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios.

### REACCIONES ADVERSAS

Normalmente las reacciones adversas son leves y transitorias. Las reacciones adversas se describen según cada intervalo de frecuencia, considerándose muy frecuentes (>10%), frecuentes (1-10%), poco frecuentes (0,1-1%), raras (0,01-0,1%), muy raras (<0,01%) o de frecuencia desconocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles). - Trastornos del sistema inmunológico: frecuencia desconocida REACCIONES DE HIPERSENSIBILIDAD, con ERITEMA o PRURITO. - Trastornos del sistema nervioso: frecuencia desconocida CEFALEA, MAREO, VERTIGO. - Trastornos gastrointestinales: frecuencia desconocida DIARREA, DOLOR ABDOMINAL, NAUSEAS.

### CONSEJOS AL PACIENTE

- Advierta a su médico y/o farmacéutico si: \* Los síntomas continúan o empeoran durante la utilización de ginkgo. \* Va a someterse a una intervención quirúrgica.

### SOBREDOSIS

Síntomas: no se han descrito casos. Medidas a tomar: - Antídoto: no hay antídoto específico. - Medidas generales de eliminación: no se han descrito. - Monitorización: estado clínico del paciente. - Tratamiento: sintomático.

### CONTRAINDICACIONES

- Hipersensibilidad a ginkgo o a cualquier otro componente del medicamento.

### PRECAUCIONES

- ALTERACIONES DE LA COAGULACION. El ginkgo podría aumentar el riesgo de sangrado, por lo que se aconseja precaución en pacientes con trastornos de la coagulación o HEMORRAGIA. Suspende el tratamiento al menos 2 semanas antes de una intervención quirúrgica. - EPILEPSIA. No puede descartarse que pudiera aumentar el riesgo de CONVULSIONES.

### PRECAUCIONES RELATIVAS A EXCIPIENTES

- Este medicamento contiene lactosa. Los pacientes con INTOLERANCIA A LACTOSA hereditaria o galactosa, insuficiencia de lactasa de Lapp o malaabsorción de glucosa o galactosa, no deben tomar este medicamento.

### EMBARAZO

Seguridad en animales: no hay datos disponibles. Seguridad en humanos: no se dispone de estudios adecuados y bien controlados en humanos. Se recomienda evitar su administración. Efectos sobre la fertilidad: no se han realizado estudios específicos en humanos.

### LACTANCIA

Seguridad en animales: no hay datos disponibles. Seguridad en humanos: se desconoce si se excreta con la leche, y las consecuencias que podría tener para el lactante. Se recomienda evitar su administración.

## **NIÑOS**

No se ha evaluado la seguridad y eficacia en niños y adolescentes < 18 años, por lo que se recomienda evitar su utilización.

## **ANCIANOS**

No se han descrito problemas específicos en ancianos que obliguen a un reajuste posológico.

## **NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN**

- Comprimidos: tragar sin masticar con suficiente cantidad de líquido. No tomar tumbado.  
Administración con alimentos: administrar separados de las comidas.

## **EFFECTOS SOBRE LA CONDUCCIÓN**

No parece presentar efectos significativos.

## **POSOLOGÍA EN INSUFICIENCIA RENAL**

No se han realizado recomendaciones posológicas específicas.

## **POSOLOGÍA EN INSUFICIENCIA HEPÁTICA**

No se han realizado recomendaciones posológicas específicas.

## **ADVERTENCIAS ESPECIALES**

- Suspender el tratamiento al menos 2 semanas antes de una intervención quirúrgica programada ante el riesgo de aumentar el tiempo de sangrado.