Prospecto del Artículo

696971 THROMBOCID 1 MG/G POMADA 1 TUBO 60 G

ACCIÓN Y MECANISMO

El pentosano polisulfato sódico es un heparinoide semisintético de bajo peso molecular de origen vegetal. Es precisamente su bajo peso molecular lo que facilita su absorción a través de la piel.

Por vía cutánea presenta actividad trombolítica, al prevenir la formación de trombos y favorecer la regresión de aquellos de pequeño tamaño ya formados. A su vez, mejora la irrigación sanguínea, especialmente en los capilares. Asimismo, también por vía cutánea, manifiesta una actividad anti-equimótica en modelos de hematomas y equímosis experimentales, al provocar un aumento del ritmo de desaparición y reabsorción de los mismos.

Presenta, al igual que otros heparinoides, una actividad anticoagulante (mucho más débil que la de la heparina), de interés desde el punto de vista clínico en los preparados de administración sistémica, pero sin especial relevancia por vía percutánea.

INDICACIONES

-VARICES: Alivio local sintomático de los trastornos venosos superficiales como pesadez y tirantez en piernas con varices.

-HEMATOMA: Alivio local sintomático de hematomas superficiales producidos por golpes.

POSOLOGÍA

Vía tópica:

- Adultos y niños > 1 año: 3-4 aplicaciones/día durante 5-6 días generalmente. Si los síntomas persisten o se produce irritación o empeoramiento, deberá evaluarse la situación clínica del paciente.

- Niños < 1 año: no se han realizado estudios sobre seguridad y eficacia, no se recomienda su uso.

REACCIONES ADVERSAS

Ocasionalmente, reacciones cutáneas relacionadas con REACCIONES DE HIPERSENSIBILIDAD.

REACCIONES ADVERSAS RELATIVAS A EXCIPIEN

- Por contener alcohol cetoestearílico puede provocar reacciones locales en la piel, como DERMATITIS DE CONTACTO.

- Por contener butil hidroxianisol como excipiente puede producir reacciones locales en la piel, tales como DERMATITIS DE CONTACTO, IRRITACION OCULAR o IRRITACION CUTANEA en membranas mucosas.

- Por contener parahidroxibenzoato de etilo puede provocar REACCIONES DE HIPERSENSIBILIDAD (posiblemente retardadas).

- Por contener parahidroxibenzoato de propilo puede provocar REACCIONES DE HIPERSENSIBILIDAD (posiblemente retardadas).

- Este medicamento contiene propilenglicol, por lo que puede producir IRRITACION CUTANEA.

- Por contener ácido sórbico este medicamento puede provocar DERMATITIS DE CONTACTO y otras reacciones locales dérmicas.

- Por contener aceite de ricino puede provocar REACCIONES DE HIPERSENSIBILIDAD cutáneas.

CONSEJOS AL PACIENTE

- Si los síntomas persisten más de 5 días o se produce irritación o empeoramiento, consultar al médico o farmacéutico.

SOBREDOSIS

En el caso de ingestión accidental del contenido del tubo, se recomienda beber una buena

cantidad de agua u otro líquido acuoso y, si aparecieran trastornos digestivos, acudir a un centro hospitalario y aplicar tratamiento sintomático.

CONTRAINDICACIONES

- Hipersensibilidad al ácido pentosanopolisúlfurico o a cualquier otro componente de la pomada.

- HEMORRAGIA y/o ALTERACIONES DE LA COAGULACION.

PRECAUCIONES

- TROMBOEMBOLISMO. Aplicar el producto suavemente y sin masaje.

EMBARAZO

Categoría C de la FDA. Se cree que este fármaco no atraviesa la placenta. No obstante, no hay estudios adecuados y bien controlados, por lo que el uso de este medicamento sólo se acepta en caso de ausencia de alternativas terapéuticas más seguras.

LACTANCIA

Se ignora si este medicamento es excretado en cantidades significativas con la leche materna, y si ello pudiese afectar al niño. No obstante, con el uso de la forma tópica no es probable que pase mucha cantidad de fármaco al torrente sanguíneo. Se recomienda no utilizar.

NIÑOS

En niños < 1 año no se han realizado estudios sobre seguridad y eficacia, por lo que no se recomienda su uso.

Esta aprobado su uso en niños > 1 año de edad.

ANCIANOS

No se han descrito problemas específicamente geriátricos en este grupo de edad.

NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN

Lavarse las manos antes y después de la aplicación.

Aplicar una fina capa de pomada en la zona afectada, distribuyéndola con un suave masaje.

Normalmente no hace falta vendaje, pero puede cubrirse con una gasa o compresa si fuera necesario.

No aplicar nunca sobre las mucosas, úlceras y heridas abiertas o infectadas.

No utilizar de forma prolongada ni en zonas muy extensas de la piel.

ADVERTENCIAS ESPECIALES

- No aplicar nunca sobre mucosas, úlceras y heridas abiertas o infectadas. Evitar el contacto con los ojos.

- No utilizar de forma prolongada ni en zonas muy extensas de la piel.

- Si los síntomas persisten más de 5 días o se produce irritación o empeoramiento, evaluar la situación clínica del paciente.