

Prospecto del Artículo

857094 TULGRASUM CICATRIZANTE 20 APOSITOS 23 X 14 CM

INDICACIONES

- TRAUMATISMO cerrados y abiertos, QUEMADURAS de segundo y tercer grado, heridas tórpidas, ULCERA CUTANEA, DERMATOSIS hiperexudativas, cirugía menor, etc.

POSOLOGÍA

Uso tópico. 1 apósito/12-24 h.

REACCIONES ADVERSAS

REACCIONES ADVERSAS RELATIVAS A EXCIPIEN

- Por contener lanolina puede provocar reacciones locales en la piel como DERMATITIS DE CONTACTO.

- Por contener parahidroxibenzoato de metilo puede provocar REACCIONES DE HIPERSENSIBILIDAD (posiblemente retardadas).

- Por contener parahidroxibenzoato de propilo puede provocar REACCIONES DE HIPERSENSIBILIDAD (posiblemente retardadas).

CONTRAINDICACIONES

- Historial de alergia a alguno de los componentes.

NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN

Abrir el sobre, extraer del interior del mismo el apósito con unas pinzas estériles, separar una de las láminas de papel, desdoblar el apósito (en el caso del tamaño grande) y aplicarlo sobre la zona afectada, separando la otra lámina de papel.